

彩・菜・栽

2016年
10月

ソラマメ、適期まきと アブラムシ防除がポイント



2016年
10月

くなるので、それよりもやや遅まきに、温暖地ではやや早まきにすることが大切です。

品種は大粒で食味が良く、3粒入り

り率の高い品種（「仁徳一寸」「三連」「打越一寸」など）が代表的です。

ソラマメの種子は作物の中では一番大きく、発芽には水分と酸素を多く必要とします。よく発芽させるには深くまき過ぎないこと。お歯黒（図を参照）を斜め下方に向けて土に差し込むようにし、芽が地上に出やすくなることが大切です。

育て方のポイントは適期まきを守り、アブラムシの防除対策を怠らないことです。

種まきどきは10月中旬～下旬ですが、寒冷地では早くまき過ぎると冬までに大きく育ち過ぎ、寒害を受けやす

るようになっているので、種まき後畝全面を黒色ポリフィルムでマルチングし、飛来を回避するよう努めます。

近年アブラムシからの感染によるウイルス病の被害が大変多く見られるようになってるので、種まき後畝全面を黒色ポリフィルムでマルチングし、飛来を回避するよう努めます。

収穫の適期は、さやの中の実が大きくなり、実を見るとお歯黒が色づいている状態のときです。

倒伏を防ぐこともできるので、一挙両得です。



ソラマメの実の付き具合をよく見ると、下方から数えて5～8節で止まりしまりし、その上方の物は上方の茎葉は不要ですから、実太りを見届けてから刈り取ってしまうと、アブラムシの発生を抑えることができます。刈り取ることにより茎葉

が旺盛に繁茂する頃、アブラムシが大発生しやすいので、早めに薬剤を散布します。

世界最古の農作物の一つ、原産地は北アフリカからカスピ海沿岸といわれますが、諸説あります。

近頃は年末から出回り始めますが、本来は初夏を代表する味覚品です。

タンパク質、糖質、ビタミン類やミネラルが多く含まれ栄養豊かですが、収穫後の糖含量の減少は極めて早く、食味が落ちやすいので、適期を見届けて収穫し、できるだけ早く



発芽したらフィルムを切開して芽を出す

